


Description (Flore de Coste) :

- Plante vivace de 5-15 cm, à hampes grêles, glabres ou pubescentes
- feuilles ovales-oblongues
- fleurs violettes
- calice glanduleux, à lobes oblongs
- corolle moyenne (10-15 mm de long), allongée, plus longue que large, à lèvres très inégales, à lobes profonds, bien plus longs que larges, dirigés en avant, non contigus
- éperon droit, grêle, égalant le tiers ou la moitié de la corolle
- capsule en poire, élargie à la base. Varie à fleurs et feuilles plus grandes, capsule ovoïde-conique (var. *macrantha* Lamot., *V. alpestris* Genty).

Floraison : Avril-août.

Écologie : Ecologie très large : marais, prairies humides, groupements fontinaux, rochers humides... en milieu alcalin ou acide. 0-2600 m.



Répartition : Alpes, Jura, Vosges, Massif Central, Pyrénées, RR au nord d'une ligne La Rochelle-Luxembourg.

Risque de confusion : En plaine, l'espèce est suffisamment caractéristique (lobes de la lèvre inférieure de la corolle obovales-oblongs, divergents, angle de la corolle très faible). En altitude, elle tend à rappeler *P. leptoceras* (lobes de la lèvre inférieure de la corolle largement obovales, chevauchants, avec une tâche blanche à la base de chaque lobe) ; elle en diffère cependant par sa couleur de fond violette (violet-bleu foncé chez *P. leptoceras*) et son éperon plus long et fin.